



YaraVita™
Zintrac™ 700



ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

Fertilizante Foliar

Composición Química:	m/v
Zinc (Zn)	70,00 %
Nitrógeno (N)	1,80 %
Ingredientes inertes	28,20 %

Total **100,00 %**

Densidad: 1,734 kg/l

Contiene: 718 gramos de ingredientes activos por litro de producto commercial.

Formulado por: **Yara UK Ltd.**, York YO42 1DN, Inglaterra
Importado y distribuido por: **Yara Guatemala S.A.**,
Calzada Roosevelt 33-86 zona 7, Edificio ILUMINA
oficina 1102, Guatemala Tel. +502 2376-1960



Contenido
neto:
1 Litro

Atención

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P391: Recoger el vertido.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar el producto alejado de fuentes de calor en un lugar seco y ventilado identifíquelo con su etiqueta.

YaraVita™ Zintrac™ 700
Esta recomendado en aplicaciones al follaje para evitar la deficiencia de Zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Aguacate: 1 a 2 l/ha (0.7 a 1.4 l/mz) en brotación (hasta 60 días antes de la cosecha). Volumen mínimo de agua: 30 l/ha (20 l/mz).

Arroz: 1 l/ha (0.7 l/mz) al inicio del macollaje y al inicio de formación de la panícula.

Volumen mínimo de agua: 50 a 200 l/ha (40-140 l/mz).

Banano: 0,3 a 1 l/ha (0.2 a 0.7 l/mz). Se puede aplicar según necesidad (p.ej. en cada vuelo).

Volumen de agua: 30 a 300 l/ha (20-200 l/mz).

Café: 1 l/ha (0.7 l/mz) aplicado en brotación y en intervalo de 10-14 días, antes de floración. En caso de deficiencia grave se puede aplicar además durante el desarrollo de los granos a la misma dosis. Volumen de agua mínimo: 200 l/ha (140 l/mz).

Caña de azúcar: aplicar 1 l/ha (0.7 l/mz) con plantas entre 30 y 120 cms de altura. Repetir en caso de ser necesario a intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua 30 a 200 l/ha (20-140 l/mz). En plantación, Aplicar en dosis de 1 l/ha (0.7 l/mz) sobre el surco de plantación, asegurando un buen mojado de los tallos.

Volumen de agua 150 a 200 l/ha (100-140 l/mz).

Cebolla: 0,3 a 1 l/ha (0.2 a 0.7 l/mz) cuando la planta tenga suficiente área para interceptar la aplicación.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha (20 a 140 l/mz).

Maíz: 0,3-1 l/ha (0.2 a 0.7 l/mz) desde la etapa de 3 a 8 hojas. Con deficiencias severas se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 30 l/ha (20 l/mz).

Melón (en campo): 0.3 a 1 l/ha (0.2 a 0.7 l/mz) en un mínimo de 50 litros de agua (40 l/mz) aplicados en el estado de 2 a 4 hojas.

Repetir aplicaciones en intervalos de 10 a 14 días si fuera necesario.

Palma Africana: Aplicar en dosis de 1 l/ha (0.7 l/mz) tres veces por año (una cada 4 meses). Para vivero (hasta 2 años de edad): 0.5 l/ha (0.35 l/mz) aplicado cada 2 meses.

Volumen de agua mínimo 30 l/ha (20 l/mz).

Piña: Aplicaciones regulares de pre-floración en intervalos de 4 semanas para aplicar un máximo de 3 l/ha (2l/mz). No aplicar más que 1 l/ha (0.7 l/mz) por cada tratamiento.

Volumen de agua mínimo: 200 l/ha (140 l/mz).

País: Guatemala

No. de Registro: 352-F-8399-42

No. de Lote: Ver el envase para más detalles

Fecha de Fabricación: Ver en el envase para más detalles

Fecha de Vencimiento: 2 años partir de la fecha de fabricación

Fecha de Registro: 27 de noviembre de 2025

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Provoque el vómito. De a beber 2 vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzocortante.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje la ropa y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos por espacio de 15 minutos con agua limpia.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente.

Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

Para consultas y asesoría técnica, llame al:
+502 2376-1960 Yara Guatemala S.A.