



YaraVita™

Last N™



Contenido  
neto: 1 litros

Peso neto:  
1,25kg

¡ALTO LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR  
EL PRODUCTO!

# Last N™

Fertilizante Foliar  
COMPOSICION QUIMICA  
**Nitrógeno (N)**

m/v  
**31,2%**

Densidad: 1,25 g/ml

N°. Registro Costa Rica: 6450  
N°. Registro Panamá: 7480  
N°. Registro Nicaragua: YCR-076D-2017

#### Atención

H319: Provoca irritación ocular grave. P280-a: Llevar gafas de protección. P264-a: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P305+P351+P338+P337+P313: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

**Importado y distribuido en Costa Rica y Nicaragua por:**  
**Yara Costa Rica S.R.L.** Oficentro Galicia, segundo piso, Uruca, San José.

Teléfono: +506 4001-0441

**Importado y distribuido en Panamá por:**  
Fertilisa, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 722-2854

Agro Pro Panamá, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 775-1910

El Rancherito, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 722-2811

**Fabricante:** Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra  
Tel: +44 1759 302545

**Origen:** Inglaterra (Reino Unido)



#### DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

**Aguacate (*Persea americana*):** 2 a 5 L/ha (1,4 a 3,5 L/mz). Aplicar 10-14 días después de trasplante y repetir a intervalos de 14 días después según necesidad. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz).

**Arroz (*Oryza sativa*):** 2 a 5 L/ha (1,4 a 3,5 L/mz). Aplicar cuando haya 2 a 3 hojas verdaderas y a la aparición de la hoja bandera. Volumen de agua mínimo: 300 L/ha (210 L/mz).

**Banano (*Musa Aa*):** Aplicación de 1 a 3 L/ha/año (0,7 a 2,1 L/mz), en fase de producción, durante el llenado de frutos repetir según necesidad a intervalos de 15 días. Volumen mínimo de agua: 200 L/ha (140 L/mz). Dosis de aplicación aérea de 0,5 -3 L/ha/ciclo quincenal o mensual (0,4 a 2,1L/mz). Volumen final de mezcla a aplicar de 14 a 30L/ha (9,8 a 21 L/mz).

**Brásicas (*Brassicacae*):** 1 a 3 L/ha (0,7 a 2,1 L/mz). Aplicar 10-14 días después del trasplante. Repetir la aplicación en desarrollo de la cabeza y en intervalos de 10 a 14 días si es necesario. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz).

**Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*):** 3 a 5 L/ha (2,1 a 3,5 L/mz) cuando la planta tiene 45 a 120 cm altura. Se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz) dosis de aplicación aérea de 1 a 3 L/ha/ciclo quincenal o mensual (0,4 a 2,1L/mz) cuando la planta tiene 45-120 cm de altura. Volumen final de mezcla a aplicar de 14 a 30L/ha (9,8 a 21 L/mz).

**Citrícos (*Citrus spp.*):** 2 a 5 L/ha (1,4 a 3,5 L/mz) antes de la floración y repetido inmediatamente después de cuaje de frutos. Volumen de agua mínimo: 300 L/ha (210 L/mz).

**Cacao (*Theobroma cacao*), Café (*Coffea arabica*):** 1 a 5 L/ha (0,7 a 3,5 L/mz). Aplicado en prefloración y post floración, también aplicar en plantaciones pequeñas un mes después de la siembra con intervalos de 22 días con un máximo de 3 aplicaciones. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz).

**Cucurbitáceas (Melón (*Cucumis melo*), Sandía (*Citrullus lanatus*) y otras cucurbitáceas):** Aplicaciones de 1 a 3 L/ha (0,7 a 2,1 L/mz) a partir de plantas de 4 a 6 hojas. Repetir según necesidad a intervalos de 10 días. Volumen mínimo de agua: 200 L/ha (140 L/mz).

**Frijoles (*Phaseolus vulgaris*):** 1 a 3 L/ha (0,7 a 2,1 L/mz). Aplicado antes de floración. Repetir la aplicación si es necesario durante el cuaje de vainas. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz).

**Maíz (*Zea mays*), Sorgo (*Sorghum*):** 2 a 4 L/ha (1,4 a 2,8 L/mz). Aplicar en la etapa de 4-6 hojas y repetir después de 10-14 días. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha (140 L/mz).

**Piña (*Ananas comosus*):** aplicaciones semanales de 5 L/ha (3,5 L/mz) en las semanas previas a la incidencia de floración natural, hasta sumar 25 litros. Volumen mínimo de agua: 200 L/ha (140 L/mz). Dosis de aplicación aérea 0,5 a 2L/ha (0,4 a 1,4 L/mz) máximo 1 aplicación por semana por 4 semanas. Volumen mínimo de agua 30L/ha (21 L/mz).

**Cultivos recomendados para aplicaciones aéreas: Piña:** 0,5 a 2L/ha (0,4 a 1,4 L/mz) máximo 1 aplicación por semana por 4 semanas. Volumen mínimo de agua 30L/ha (21 L/mz). **Banano:** 0,5 -3 L/ha/ciclo quincenal o mensual (0,4 a 2,1L/mz). **Caña de azúcar:** 1 a 3 L/ha/ciclo quincenal o mensual (0,4 a 2,1L/mz) cuando la planta tiene 45-120 cm de altura. Volumen final de mezcla a aplicar de 14 a 30L/ha (9,8 a 21 L/mz). Para recomendaciones específicas para su cultivo, le sugerimos consultar a su asesor Yara.

**Forma de aplicación:** fertirriego, aplicación foliar, aérea\*.

**Preparación de la mezcla:** agitar el producto antes de usarlo. Verter la dosis recomendada del producto al tanque, cuando tenga tres cuartas partes de agua, agitar y aforar con el volumen de agua faltante.

Verificar el pH de la mezcla final con valores óptimos de 5,5 a 6,5. La mezcla de productos es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una mezcla de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara.

**Incompatibilidad:** incompatible con hipoclorito de sodio o de calcio.

**Fitotoxicidad:** Dentro de las dosis recomendadas no es fitotóxico.

**\*Se debe cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea indicadas en el D.E. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola).**

#### Primeros auxilios:

**Contacto con los ojos:** Enjuagar abundantemente con agua corriente. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Buscar atención médica si se produce una irritación.

**Inhalación:** Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Consultar a un médico en caso de malestar.

**Contacto con la piel:** Lavar con agua y jabón. Obtenga atención médica si se desarrolla irritación.

**Ingestión:** Lave la boca con agua. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Consultar a un médico en caso de malestar. Si los síntomas persisten acudir al centro médico más cercano o llame al 911.

**Medidas de mitigación y protección al ambiente:** Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Tóxico para organismos acuáticos.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Evite temperaturas superiores a 40°C.

#### CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.