



**YaraVita™**  
**Azos™ 300**

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα

# Azos™ 300

**ΚΛΠ 1(Γ)(Ι)(Β)(i) Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα**  
N (S) 15,2 (+57)  
Υγρό Διάλυμα

### Εγγυημένη ανάλυση:

**15,2% β/β ή 20% β/ο = 200 γραμ./λίτρο Ολικό Άζωτο (N)**  
[10,5% β/β αμμωνιακό άζωτο, 4,7% β/β άζωτο σε μορφή ουρίας]  
**57% β/β ή 75% β/ο = 750 γραμ./λίτρ Τριοξείδιο του Θείου (SO<sub>3</sub>)**  
υδατοδιαλυτό

**Συστατικά:** Θειοθειικό αμμώνιο CAS Νο 7783-18-8 (ΚΣΥ 1), ουρία CAS Νο 57-13-6 (ΚΣΥ 1), (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών),

Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Αριθμός παρτίδας/Ημερομηνία Παρασκευής: Βλέπε Συσσκευασία

**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 2107793777 (Ελλάδα)**

**Αρ. Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111983182**

**Αρ. Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 (Κύπρος)**

Εισάγεται & διανέμεται από την **Yara Ελλάς Α.Ε.** Λ. Συγγρού 137, 171 21 Νέα Σμύρνη.  
Τηλ.: +30 2109370355 [www.yara.gr](http://www.yara.gr)

Διανομή στην Κύπρο: **Lambrou Agro Ltd**, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus.  
T: 357 22667908

Παρασκευάζεται από: **Yara UK Ltd**, Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

**5 λίτρα**

καθαρό βάρος  
6,58kg

# YaraVita™ Azos™ 300

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙ (επιτραπέζιο, οινοπώλησιμο):** 300 έως 500 ml/στρ. εφαρμόζονται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών, στο στάδιο ανάπτυξης των βλαστών και βοτρυών και στο στάδιο της καρπόδεσης. Επίσης, εάν απαιτείται, επαναλάβετε μία ή δύο φορές ανά διαστήματα 10 έως 14 ημερών μετά την καρπόδεση. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε και στο πρώιμο στάδιο του γυαλισματος των ραγών (veraison) και επαναλάβετε 10 έως 14 ημέρες αργότερα. Σημειώση: Αποφύγετε τις εφαρμογές κατά την άνθηση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 έως 50 λίτρα/στρ.

**Μηλιά:** 300-500 ml/στρ. πριν την έναρξη της ανθοφορίας. Επανάληψη κατά την καρπόδεση και 10-14 ημέρες αργότερα εάν είναι απαραίτητο, ή μετασυσλεκτικά πριν την πτώση των φύλλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 lt/στρ. Προειδοποίηση: Να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ένα δραστικό συστατικό που περιέχει το προϊόν, έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί αραίωση των καρπών, όταν χρησιμοποιηθεί με δοσολογία 1,5 lt/στρ. Αυτή η δοσολογία μπορεί να προκαλέσει επίσης σημάδια / καυμάτα στα φύλλα. Η Yara δεν εγγυάται για αυτή την εφαρμογή.

**Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκινιά:** Έως τρεις εφαρμογές των 300-500 ml/στρ. στην καρπόδεση, επανάληψη 10-14 μέρες αργότερα εάν είναι απαραίτητο ή μετασυσλεκτικά πριν την πτώση των φύλλων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 50 lt/στρ.

**Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο:** 0,5 lt/στρ. σε φυτά ύψους 15 εκ. Για μέτρια ή σοβαρή τροφοπενία επαναλάβετε τις εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 lt/στρ.

**Δημητριακά:** 0,5-1 lt/στρ. από την έκπτυξη του ψευδοβλαστού έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου. Για μέτρια έως σοβαρή τροφοπενία, επαναλάβετε τις εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 3 lt/στρ. Εναλλακτικά: 200-300 ml/στρ., 1 ή 2 εφαρμογές από το αδελφωμα έως την εμφάνιση του πρώτου κόμβου με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 lt/στρ. Μόνο για το σιτάρι: Μέχρι 1 lt/στρ. από την πλήρη έκπτυξη του στάχους έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης γάλακτος κατά την ωρίμανση των σπέρων. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 3 lt/στρ.



Για περαιτέρω συμβουλές και πληροφορίες, αρμόστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας το smartphone σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**  
Αναμίξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με άλλα προϊόντα έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλος σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) για σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων συμβουλών.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση. Ανατρέξτε στο MSDS για περισσότερες πληροφορίες, που διατίθεται στη διεύθυνση [www.yara.com](http://www.yara.com).

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προσταγείτε το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (-5°C < και <35°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων.

