YaraAmplix™

OPTIMARIS™

AVISO
Lea la etiqueta antes de utilizar el producto
Hoja de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

FAVOR de AGITARSE ANTES de USAR.

Fertilizante Foliar Líquido: POTASIO

Análisis:
7,6% de Potasio (K_2O)
10,2% de Carbono (C) orgánico

Registro COFEPRIS: RSCO-387/VIII/25

Hecho en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte por **Yara UK Ltd.**, York YO42 1DN, Reino Unido.
Tel. +44 1759 30 25 45.
Importado, almacenado y distribuido por:
YARA MEXICO S DE RL DE CV. Avenida Américas 1545, piso 24, Col. Providencia 1ª Sección, CP: 44630.
Guadalajara, Jalisco, México.
+52 33 8526 2750

CONT. NET.: 1 L
www.yara.com.mx

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aguacate: Aplicar de 2.5 a 3 l/ha durante fases críticas del crecimiento, a la caída de pétalos durante el desarrollo temprano de la fruta. Utilice volumen de agua suficiente para una buena cobertura foliar, la concentración máxima de producto en aplicación foliar no debe exceder 0.5 l/100 litros de agua Aplicación foliar en fase de producción, con intervalos de 10 a 14 días.
Banano (*Musa sp.*): Dosis: 1- 2 l/ha. Época de aplicación: Desarrollo vegetativo, previo a la floración y llenado de racimos. Forma de aplicación: foliar. Volumen de agua mínimo: 20 l/ha.
Caña de Azúcar: aplicar 1.5 a 3 l/ha. Realizar aplicaciones cuando la caña está entre 30 a 120 cm de altura con intervalos de 10 a 14 días (crecimiento vegetativo).
Aplicación foliar con volumen mínimo de 200 l agua/ha.
Chile: Aplicar de 2 a 3 l/ha a intervalos de 10 a 14 días en floración y crecimiento de fruto. Volumen mínimo de agua de 200 l/ha.
Cítricos (limón mexicano, lima persa, naranja, toronja): Aplicar 1.5 a 3 l/ha durante fases críticas del crecimiento, caída de pétalos y desarrollo de la fruta. Utilice volumen de agua suficiente para una buena cobertura foliar, la concentración máxima de producto en aplicación foliar no debe exceder 0.5 l/100 litros de agua.
Manzana: Aplicar 1.5 a 3 l/ha durante fases críticas del crecimiento, a la caída de pétalos durante el desarrollo temprano de la fruta. Utilice volumen de agua suficiente para una buena cobertura foliar, la concentración máxima de producto en aplicación foliar no debe exceder 0.5 l/100 litros de agua.
Papas: Aplicar 1.5 a 2 l/ha desde el inicio de la tuberización con intervalos de 10 a 15 días.
Aplicación Foliar con volumen mínimo de 200 l agua/ha.
Pepino: Aplicar 2.5 l/ha a intervalos de 10 a 14 días. Aplicar desde caída de pétalos hasta llenado de frutos. Concentración maxima no debe exceder 0.5 l/100 l de agua.
Tomate: Aplicar 2.5 l/ha a intervalos de 10 a 14 días. Aplicar desde caída de pétalos hasta llenado de frutos. Concentración maxima no debe exceder 0.5 l/100 l de agua.
Uva de mesa y vinícola: Aplicar 1 a 2.5 l/ha durante fases críticas del crecimiento, caída de pétalos y durante el desarrollo de la fruta.Utilice volumen de agua mínimo de 200l/ha.

INSTRUCCIONES DE USO
SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.
Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN
Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar www.tankmix.com para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

PRECAUCIONES
Evite aplicar en condiciones climatológicas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en www.yara.com.

ALMACENAMIENTO
Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (-5°C < y <35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

CONDICIONES DE VENTA
Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO
Evite el contacto con la piel y/o ojos. Consulte las indicaciones de primeros auxilios.
No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación.
No se almacene junto a productos alimenticos.
No se reutilice este envase, destruyase.
No se deje al alcance de los niños.

FOR INFORMATION ONLY

WLMXYPDEL00 V.03.26