

ใบรับแจ้งเลขที่ รส. 2112579/2566 (สมุดวิชาเกษตร)

ปุ๋ยเคมี
ธาตุอาหารเสริม
ยาราวีต้า บอร์ลิฟ



ตรายารา
ปริมาณสุทธิ 1 ลิตร

ปริมาณธาตุอาหารเสริม
ใบรอนที่ละลายน้ำ (B).....10%

ผู้นำเข้า
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์เอ็ดเอ็มเคอเกียรติ
เลขที่ 2706-2707 และ 2709-2713
ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 261 3242 โทรสาร 02 261 3250
ผู้ผลิต
บริษัท ยารา ยูเค จำกัด ประเทศสหราชอาณาจักร
ปุ๋ยเหล่านี้มีพิษเกิดขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ง่าย ควรเปิดด้วยความระมัดระวัง

พืชที่แนะนำให้ใช้

ธาตุอาหารเสริม	ชนิดพืช		
	พืชกลุ่มที่ 1	พืชกลุ่มที่ 2	พืชกลุ่มที่ 3
B 10 %	แตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลิสงเตามะเขือต่างๆ ผักกาดหอม ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล	พืชผักตระกูลกะหล่ำ	พืชหัว หอม แครอท มันฝรั่ง สับปะรด
อัตราปุ๋ยเคมีที่ใช้ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร	5-20	20	20
วิธีการใช้	ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบ และทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน		

- คำแนะนำ** ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อนทุกครั้ง หากไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

 - โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยเคมีพ่นทางใบ พืชใช้ประโยชน์ได้น้อย ควรใช้ปุ๋ยเคมีเสริมกับการให้ปุ๋ยเคมีทางดิน
 - ควรพ่นในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลาที่อากาศไม่ร้อน ลมไม่พัดแรง และคาดว่าเป็นไปได้
 - ขณะที่พ่น พืชต้องไม่เหี่ยวเฉา หรือขาดน้ำ
 - การพ่น อย่าให้ถึงเปลือกพืช เพราะจะทำให้เสียค่าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีที่ใช้พ่นทางใบ เมื่อตกลงดิน จะมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยเคมีที่ใส่ทางดิน
 - ควรเก็บรักษาปุ๋ยเคมีในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บปุ๋ยเคมีไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็ก
 - ระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
 - ปุ๋ยเหล่านี้มีพิษเกิดขึ้น และอาจเป็นอันตรายได้ง่าย ควรเปิดด้วยความระมัดระวัง



YaraVita BORLIV
ยาราวีต้า บอร์ลิฟ




ใบรอน
1 ลิตร

คุณสมบัติ เป็นธาตุอาหารพืช อยู่ในรูปสารละลาย สามารถดูดซึมเข้าสู่พืชอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ มีส่วนในการสร้าง พัฒนาดอกและผล ช่วยในการผสมเกสร

พืชที่แนะนำให้ใช้

กลุ่มพืช	ช่วงการใช้	อัตราการใช้ปุ๋ยต่อน้ำ 20 ลิตร	ปริมาณปุ๋ยเคมีต่อไร่ต่อครั้ง	จำนวนครั้งการพ่น
ไม้ดอก : กล้วยไม้, กุหลาบ, เยอบีร่า และอื่นๆ	ระยะแตกใบใหม่	20 ซีซี	80 ซีซี	2ครั้ง:ห่างกัน 10 - 14 วัน
ผักกินใบ : คะน้า, ผักกาดเขียวปลี, กวางตุ้ง และอื่นๆ	ระยะแตกใบใหม่ใบที่ 4-6	20 ซีซี		
พืชหัว : หอมแดง, กระเทียม, หอมหัวใหญ่, มันฝรั่ง, มันสำปะหลัง และอื่นๆ	หอม กระเทียม เมื่อต้นสูง 15 ซม. มันฝรั่ง ระยะต้นใหม่งอกแล้ว และระยะสร้างหัว มันสำปะหลัง ระยะ 2 เดือนหลังงอก และระยะขยายหัว	20 ซีซี		
พืชไร่ : ข้าวโพด, อ้อย และอื่นๆ	ข้าวโพด ระยะแตกใบใหม่ใบที่ 3-8 อ้อย เมื่อต้นสูง 30-120 ซม.	16 ซีซี		
ข้าว	ระยะแตกกอ	16 ซีซี		
สับปะรด	ระยะแตกใบใหม่	16 ซีซี		
ผักกินผล : พริก, มะเขือเทศ, มะเขือ, แตงโม, แตงกวา และอื่นๆ	ระยะแตกใบใหม่ใบที่ 4-6	8-16 ซีซี		
พืชตระกูลส้ม : ส้มเขียวหวาน, มะนาว, ส้มโอ	ระยะพัฒนาดอก และระยะติดผล	4-8 ซีซี		
ไม้ผลยืนต้น : ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ชมพู, ลำไย, มะม่วง, ฝรั่ง, กล้วย และอื่นๆ	ระยะพัฒนาดอก และระยะติดผล	4-8 ซีซี		

- หมายเหตุ**

 - ควรพ่นซ้ำอีกครั้งที่ระยะ 10 ถึง 14 วัน หากพบอาการขาดธาตุแบบปานกลางถึงรุนแรง
 - ห้ามพ่นในระยะออกดอกจนถึงหลังกลีบดอกร่วง 2 สัปดาห์ในพืชตระกูลส้มและไม้ผลยืนต้น